

"PERMANENCIA DE LUBRICANTES OCULARES SOBRE LA  
SUPERFICIE OCULAR SEGUN GRADO DE SEVERIDAD DEL  
SINDROME DE OJO SECO EN PACIENTES DE LOS HOSPITALES  
CARDIOVASCULAR DEL NIÑO Y DE TUNJUELITO, BOGOTA-  
COLOMBIA 2010"

MAGOLA ISABEL PEÑARANDA BUSTAMANTE

RESIDENTE DE PRIMER AÑO DE OFTALMOLOGIA  
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

2010

T/ROSS  
6137  
P39A  
2010  
EJ-2

***"PERMANENCIA DE LUBRICANTES OCULARES SOBRE LA  
SUPERFICIE OCULAR SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD DEL  
SÍNDROME DE OJO SECO EN PACIENTES DE LOS HOSPITALES  
CARDIOVASCULAR DEL NIÑO Y DE TUNJUELITO, BOGOTÁ –  
COLOMBIA, 2010"***

**Dra. MAGOLA ISABEL PEÑARANDA BUSTAMANTE**



**RESIDENTE DE PRIMER AÑO DE OFTALMOLOGÍA  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**

**2010**

***"PERMANENCIA DE LUBRICANTES OCULARES SOBRE LA  
SUPERFICIE OCULAR SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD DEL  
SÍNDROME DE OJO SECO EN PACIENTES DE LOS HOSPITALES  
CARDIOVASCULAR DEL NIÑO Y DE TUNJUELITO, BOGOTÁ –  
COLOMBIA, 2010"***

**TRABAJO DE ASCENSO**

**Dra. MAGOLA ISABEL PEÑARANDA BUSTAMANTE**

**OFTALMÓLOGO ASESOR**

**DR. JAVIER MAURICIO CRUZ ORJUELA**

**RESIDENTE DE PRIMER AÑO DE OFTALMOLOGÍA**

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**

**2010**

---

***PERMANENCIA DE LUBRICANTES OCULARES SOBRE LA  
SUPERFICIE OCULAR SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD DEL  
SÍNDROME DE OJO SECO EN PACIENTES DE LOS HOSPITALES  
CARDIOVASCULAR DEL NIÑO Y DE TUNJUELITO, BOGOTÁ –  
COLOMBIA, 2010”***

**RESUMEN**

La enfermedad del ojo seco, que hace parte del grupo de enfermedades de la superficie ocular, tiene una variedad etiológica así como distintas alteraciones anatomopatológicas. Por lo cual se han elaborado diferentes clasificaciones con el fin de entender mejor la fisiopatología de esta enfermedad y, basado en esto, realizar estudio y tratamiento adecuados dependiendo de la clasificación de la misma.

Éstas clasificaciones en primer lugar incluyen una clasificación etiológica, en segundo lugar se ha clasificado de forma mecanicista y por último, otra de las actuales clasificaciones y de mayor importancia clínica es la que se basa en la gravedad de los síntomas y signos, que nos estadifica de acuerdo al grado de severidad de los mismos, teniendo niveles de gravedad 1, 2, 3, y 4

siendo, ojo seco leve, moderado, severo y muy severo, la cual se ha tomado como base para realizar la selección y clasificación de los pacientes incluidos en este estudio.(1)

Encontramos en el mercado diferentes tipos de lágrimas artificiales o lubricantes oculares para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco, siendo éstas utilizadas de forma universal y de manera inespecífica para el tratamiento de la enfermedad sin tener en cuenta el grado de severidad. En este estudio pretendemos evaluar el comportamiento de los principales lubricantes oculares más representativos en el manejo de pacientes con enfermedad del ojo seco, según el grado de severidad, utilizando el test de Lisamina Verde como método clínico y cuestionario de severidad de síntomas, para clasificar pacientes con ojo seco leve, moderado y severo.

**SANMARTÍN**  
Fundación Universitaria

---

**CRAI**  
Centro de Recursos para el  
Aprendizaje y la Investigación

**Nota**

Este trabajo se encuentra disponible únicamente en **formato físico**, ya que no cuenta con versión digital. Por tal motivo, en este repositorio solo serán visibles las páginas preliminares con fines informativos. Para su consulta completa, el usuario deberá verificar la ubicación o sede donde se encuentra el ejemplar físico, o bien solicitar información adicional escribiendo al correo institucional:

**[repositoriofusm@sanmartin.edu.co](mailto:repositoriofusm@sanmartin.edu.co)**